

Analgetika

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20ff.
Teilnahme bis 27.04.2025



- 1. Ab wann spricht man von chronischen Schmerzen?**
 - A) wenn die Schmerzen länger als drei Wochen andauern
 - B) wenn die Schmerzen länger als drei Monate andauern
 - C) wenn die Schmerzen länger als sechs Monate andauern
- 2. Entzündungsschmerzen sind ...**
 - A) nozizeptive Schmerzen.
 - B) noziplastische Schmerzen.
 - C) neuropathische Schmerzen.
- 3. Was charakterisiert neuropathische Schmerzen?**
 - A) Sie gehen fast immer vom Gehirn oder Rückenmark aus.
 - B) Sie sprechen meist schlecht auf herkömmliche Analgetika an.
 - C) Es liegt kein ursächlicher Defekt vor.
- 4. Welches Analgetikum ist auch als Salbe oder Gel zur lokalen Anwendung erhältlich?**
 - A) Paracetamol
 - B) Tramadol
 - C) Diclofenac
- 5. Was unterscheidet Naproxen von anderen NSAID?**
 - A) Es verursacht selten gastrointestinale Nebenwirkungen.
 - B) Es verhält sich kardiovaskulär neutral.
 - C) Es wirkt spasmolytisch.
- 6. Wie hoch darf Ibuprofen in der Selbstmedikation dosiert werden?**
 - A) 1.200 Milligramm pro Tag
 - B) 1.800 Milligramm pro Tag
 - C) 2.400 Milligramm pro Tag
- 7. Wie viele Stunden müssen zwischen erster und zweiter Naratriptangabe liegen?**
 - A) mindestens eine Stunde
 - B) mindestens zwei Stunden
 - C) mindestens vier Stunden
- 8. Welche Paracetamol-Einzeldosis sollte ein 30 Kilogramm schweres Kind erhalten?**
 - A) 150 bis 300 Milligramm
 - B) 300 bis 450 Milligramm
 - C) 450 bis 600 Milligramm
- 9. Herr Jacobsen plagt Kopfschmerzen wegen seiner neuen Brille. Er möchte deshalb ein geeignetes Schmerzmittel kaufen. Seine koronare Herzkrankheit wird zurzeit mit einem Blutdrucksenker, einem Statin und ASS behandelt. Zu welchem Schmerzmittel raten Sie Herrn Jacobsen?**
 - A) Ich rate zu Naproxen.
 - B) Ich rate zu Diclofenac.
 - C) Ich rate zu Paracetamol.
- 10. Frau Gruber kommt mit ihrem achtjährigen Sohn in die Apotheke. Ihm wurde soeben ein Zahn gezogen. Welches der folgenden Schmerzmittel können Sie Frau Gruber für ihren Sohn mitgeben?**
 - A) Ibuprofen
 - B) Acetylsalicylsäure
 - C) Diclofenac



◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.