

Reisekrankheiten

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20ff.
Teilnahme bis 27.06.2025



- 1. Wie groß ist das Zeitfenster, in dem eine vergessene Einnahme der Minipille mit dem Wirkstoff Levonorgestrel nachgeholt werden kann, ohne dass zusätzliche mechanische Verhütungsmittel notwendig sind?**
 - A) 12 Stunden
 - B) 3 Stunden
 - C) 18 Stunden
- 2. Welcher dieser Wirkstoffe gegen Reisedurchfall wirkt durch Bindung an Opiatrezeptoren in der Darmwand?**
 - A) Bisacodyl
 - B) Pektin
 - C) Loperamid
- 3. Welche Dosierung wird für die Einnahme von Melatonin empfohlen, um auf Fernreisen die innere Uhr auf den neuen Tag-Nacht-Rhythmus einzustellen?**
 - A) 0,5 bis 5 mg
 - B) 5 bis 10 mg
 - C) 10 bis 20 mg
- 4. Welche Aussage zum Dengue-Virus ist falsch?**
 - A) Das Virus ist vor allem in tropischen und subtropischen Gegenden verbreitet.
 - B) Überträger des Dengue-Virus sind Aedes-Mücken.
 - C) In Europa wurden noch keine Fälle von Dengue-Fieber beobachtet.
- 5. Welcher Anwendungshinweis gilt für Kaugummi gegen Reiseübelkeit mit dem Wirkstoff Dimenhydrinat?**
 - A) eine halbe Stunde vor Reisebeginn einnehmen
 - B) bei den ersten Symptomen mit dem Kauen beginnen
 - C) etwa zehn Minuten nach Symptombeginn anwenden
- 6. Welche Aussage zur Chemoprophylaxe mit Atovaquon und Proguanilhydrochlorid der Malaria ist falsch?**
 - A) Die verschreibungspflichtige Kombination wird einmal täglich eingenommen.
 - B) Mit der Einnahme wird 48 oder 24 Stunden vor der Einreise in das Malariagebiet begonnen.
 - C) Die Einnahme wird während des Aufenthalts sowie bis zu 14 Tage nach der Abreise fortgesetzt.
- 7. Probiotika enthalten ...**
 - A) lebende, pathogene Bakterien- oder Hefestämme.
 - B) nicht lebende, nicht pathogene Bakterien- oder Hefestämme.
 - C) lebende, nicht pathogene Bakterien- oder Hefestämme.
- 8. Wie wirkt Racecadotril?**
 - A) Es hemmt den Einstrom von Wasser in das Darmlumen.
 - B) Es fördert die Rückresorption von Kalium ins Blut.
 - C) Es stoppt die übermäßige Peristaltik des Darms.
- 9. Welcher Wirkstoff kann als Mückenschutzmittel zum Imprägnieren von Kleidung eingesetzt werden?**
 - A) DEET
 - B) Icaridin
 - C) Permethrin
- 10. Ab welchem Alter darf Loperamid in der Selbstmedikation gegen Durchfall kurzfristig eingesetzt werden?**
 - A) ab 18 Jahre
 - B) ab 12 Jahre
 - C) ab 6 Jahre



◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.