

Ophthalmika

Den Fortbildungsbeitrag finden Sie auf Seite 20ff.
Teilnahme bis 28.08.2025



1. Aus welchen Teilen besteht die mittlere Augenhaut (Uvea)?

- A) Regenbogenhaut, Ziliarkörper, Aderhaut
- B) Hornhaut, Regenbogenhaut, Netzhaut
- C) Regenbogenhaut, Aderhaut, Netzhaut

2. Welche Aussage zur Netzhaut ist nicht richtig?

- A) Die Netzhaut enthält lichtempfindliche Zellen (Stäbchen und Zapfen).
- B) In der Netzhautmitte (Fovea) befinden sich die meisten Stäbchen.
- C) Stäbchen und Zapfen wandeln Lichtsignale in Nervenimpulse um.

3. Welche Arzneimittel kommen bei einer Endophthalmitis zum Einsatz und welcher Applikationsweg wird dabei bevorzugt?

- A) Antibiotika, intravenös
- B) Antikörper, intravitreal
- C) Antihistaminika, lokal

4. Was bewirken Mydriatika?

- A) Tränenfilmerngänzung
- B) Pupillenerweiterung
- C) Augeninnendrucksenkung

5. Welche Funktion hat Carmellose in Ophthalmika?

- A) Befeuchtung, weil Wasser-bindend
- B) Lipidersatz, weil Lecithin-reich
- C) Konservierung, weil antibakteriell wirksam

6. Bei welcher Erkrankung wird Brolicizumab eingesetzt?

- A) Glaukom
- B) Blepharitis
- C) nAMD

7. Welche dieser Substanzen ist kein Konservierungsmittel für Ophthalmika?

- A) Polyhexanid
- B) Chlorphenamin
- C) Benzalkoniumchlorid

8. Eine Kontaktlinsenträgerin löst ein Rezept über eine antibiotische Augensalbe ein, da ihr Augenarzt eine bakterielle Infektion diagnostiziert hatte. Sie empfehlen ihr, ...

- A) nach der Anwendung der Salbe gründlich die Hände waschen.
- B) die Salbe vorsichtshalber drei Tage länger als verordnet anzuwenden.
- C) nach erfolgreicher Behandlung eine Kontaktlinsenpause einzulegen.

9. Ein Kunde wünscht ein Mittel gegen starke Schmerzen und Rötung im rechten Auge. Außerdem berichtet er über Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie empfehlen ...

- A) für drei bis fünf Tage Augentropfen mit Naphazolin, das als Sympathomimetikum Blutgefäße verengt.
- B) eine sofortige Konsultation des Augenarztes, um eine schwere Erkrankung auszuschließen.
- C) Ibuprofen gegen die Schmerzen und ein Augenbad, um allergene Pollen auszuspülen.

10. Welcher Anwendungshinweis sollte bei der Abgabe Cromoglicinsäure-haltiger Augentropfen gegeben werden?

- A) Applikation bereits einige Tage vor erwartetem Allergenkontakt beginnen
- B) nicht länger als drei bis fünf Tage anwenden
- C) nicht anwenden, wenn die Kundin schwanger ist oder sein könnte



◀ Hier geht es zum Online-Fragebogen.