


# Der Beratungs Booster

Posterisan® akut mit Lidocain ist die Nr. 1 Hämorrhoidensalbe aus der Apotheke<sup>1</sup> bei starkem Juckreiz und Schmerzen im Analbereich. Sie ist Teil eines Produkttrios von DR. KADE, zu dem auch Posterisan® protect und FAKTU® lind Hämorrhoidensalbe und -zäpfchen gehören.


1.



## Für wen geeignet?

Für erwachsene Kund\*innen, die unter akuten Schmerzen und starkem Jucken am Po leiden sowie eine schnelle und zuverlässig wirksame Rektalsalbe suchen. Die Salbe ist nach ärztlicher Rücksprache auch in der Schwangerschaft und in der Stillzeit anwendbar<sup>2</sup>.


2.



## Was ist enthalten?

Posterisan® akut enthält das Lokalanästhetikum Lidocain in einer Konzentration von fünf Prozent. Die vegane und mineralölfreie Salbengrundlage hat eine gelartige Konsistenz. Sie lässt sich leicht auftragen und dichtet die Haut nicht ab.

3.



## Wie wirkt Posterisan® akut?

Lidocain betäubt schnell Schmerzen und starken Juckreiz in der Analregion. Es wirkt innerhalb von 30 Minuten nach der Anwendung und verschafft so Linderung ab dem ersten Behandlungstag<sup>3</sup>. Dank eines beigefügten Applikators kann die Salbe auch innerlich angewendet werden.

4.



## Darum empfehlen!

- ▲ lindert schnell die unangenehmen Beschwerden im Analbereich
- ▲ die einzige rezeptfreie Rektalsalbe mit Lidocain
- ▲ die Nr. 1 bei Hämorrhoidalleiden<sup>1</sup>
- ▲ für die äußerliche und innerliche Anwendung

## Posterisan® akut Salbe



## Dosierung

2-3 mal tgl.  
bis zu 2,5 g

## Abgabebetips und Hinweise

- ▲ Posterisan® akut dünn auftragen, idealerweise morgens und abends.
- ▲ Bei Bedarf die Rektalsalbe 30 Minuten vor dem Stuhlgang oder danach anwenden.
- ▲ Mittels Applikators lässt sich die Salbe in den Analkanal einführen und dort über die seitlichen Applikatoröffnungen durch Drehbewegungen verteilen.

Für mehr Infos den QR-Code scannen



<sup>1</sup>nach Abverkauf OTC-Hämorrhoidensalben, IH-Galaxy (Stand 12/2024); <sup>2</sup>Fachinformation Posterisan® akut, www.embryotox.de; <sup>3</sup>Rothhaar, A., et al. (2014). „Placebo-controlled double blind study of the efficacy and tolerability of lidocaine containing rectal ointment to treat anorectal itching in patients with haemorrhoids.“ Akt Dermatol 40 (10): 412-417

monostearat-L-(+)-6-O-Palmitoylascorbinsäure-all-rac-α-Tocopherol-Lecithin (2,5;7,5;20;20;25;25); Natriumdecat (Ph. Eur.); Glycerol(mono/di/tri)adipat/alkanoat(C<sub>18</sub>-C<sub>19</sub>/isostearat); dickflüssiges Paraffin; mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>20</sub>-C<sub>30</sub>); Propylenglycol; weißes Vaselin; gereinigtes Wasser; Wollwachs (enth. Butylhydroxytoluol). 1 Zäpfchen enth. 400 mg Auszug aus Hamamelisblättern (1,2). Auszugsmittel; Ethanol 60 % (V/V). Sonst. Bestand.: Glycerolmonooleat; Hartfett; mikrokristalline Kohlenwasserstoffe (C<sub>20</sub>-C<sub>30</sub>); Polyglycerolpoly(12-hydroxystearat); hochdisperses Siliciumdioxid; methyliert; alpha-Tocopherol (Ph. Eur.). **Anw.: Salbe:** Zur Besserung der Beschwerden bei Hämorrhoiden Grad I und II. **Zäpfchen:** Zur Linderung von Beschwerden wie Juckreiz, Brennen, leichte Blutungen bei Hämorrhoiden Grad I u. II. **Gegenanz:** Überempfindlichkeit gg. Hamamelis, Wollwachs (bei Salbe) oder einen d. sonst. Bestandteile. **Nebenw.: Salbe:** Sehr selten: allergische Reaktionen durch Überempfindlichkeit gg. Inhaltsstoffe. **Zäpfchen:** Häufig; kurz anhaltende Irritationen; sehr selten: allergische Reaktionen gegenüber Hamamelis-haltigen Extrakten. Die Salbe enthält Wollwachs, Butylhydroxytoluol, Cetylstearylalkohol und Propylenglycol. Packungsbeilage beachten. Stand: 03/2023. **DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin**

**Posterisan® akut 50 mg/g Rektalsalbe**  
**Wirkstoff:** Lidocain. **Zus:** 1 g Rektalsalbe enth. 50 mg Lidocain. Sonst. Bestand.: Cetylalkohol, Macrogole, gereinigtes Wasser. **Anw.:** Anwendung bei Erwachsenen; Linderung von Schmerzen im Analbereich vor proktologischer Untersuchung; Symptomatische Behandlung von Juckreiz und Schmerzen im Analbereich (z. B. aufgrund von Hämorrhoiden). **Gegenanz:** Überempfindlichkeit gg. Lidocain od. einen der sonst. Bestandteile. **Nebenw.:** Sehr häufig: Lokale Überempfindlichkeitsreaktionen (z. B. Jucken u. Brennen); häufig: Durchfall; gelegentlich: Anorektales Unwohlsein (z.B. leichte Schmerzen), Rötung (perianales Erythem) Enthält Cetylalkohol. Packungsbeilage beachten. Stand: 04/2024. **DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin**

**FAKTU® lind Hämorrhoidensalbe / FAKTU® lind Hämorrhoidenzäpfchen**  
**Wirkstoff:** Hamamelisblätter- und -zweigedestillat/Hamamelisblätter-Auszug. **Zus:** 1 g Salbe enth. 62,5 mg Destillat aus frischen Hamamelisblättern und -zweigen (1:1,12-2,08). Destillationsmittel: Ethanol 6 % (m/m). Sonst. Bestand.: Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.); Citronensäure-Glycerolmonooleat-Glycerol-